Observation sur la fracture de lacromion

Quoi que de tous tems les auteurs aient porté un prognostique douteux sur les fractures des [illegible] articulations, et qu'on ait presque toujours regardé leurs mauvaises suites comme des accidens inseparable et dependans de la nature des parties blessées; il arrive le plus souvent cependant qu'elles ne sont que l'effet des moiens mal dirigés qu'on a emploié pour les prevenir.

l'indication comme l'on sçait dans toutes les fractures, c'est la reunion; dans celle ci il n'est qu'en possible de la procurer sans que le calus ne s'epanche en trop grande quantité dans l'article et ne produise l'ankilose. les os d'ailleurs, et surtout ceux qui forment les parois des cavités, se reunissent trés difficilement a cause de la sinovie qui detrempe le suc osseux, et du mouvement auquel sont souvent exposées les pieces d'os avant le parfait endurcissement du cal: de la vient que le suc retenu, et forme sur les surfaces de l'os fracturé une espece de croute cartillagineuse dont la souplesse est entretenue par la sinovie qui l'humecte continuellement. le perioste ou les ligamens s'endurcissent et maintiennent les fragmens d'os rapprochés, de maniere que si c'est la cavité qui est fracturée elle pourra encore conserver assés de fermeté pour supporter les mouvemens de la tête qu'elle reçoit; j'ai vu dans un cadavre une portion de la cavité cotiloïde de l'os des isles fracturée, et dont la piece n'etoit soutenue avec le reste de la cavité, que par le moien du perioste et des ligamens, qui s'attachoient si fermement que cela ne l'empechoit pas de resister au mouvement de la tête du femur que je faisois agir contre. l'observation suivante d'ailleurs confirmera davantage ce que je viens d'avancer.

Le 9 octobre 1768. je fis l'ouverture du cadavre d'un homme âgé de soixante dix huit ans charetier de profession. d'un temperament sanguin et robuste, ayant beaucoup d'embonpoint; en examinant l'epaule droite pour une preparation anatomique, je ne m'apperçus d'aucune difformité a l'exterieur, mais quand j'eus levé les muscles qui la recouvrent, et que la capsulle qui est situeé sous le deltoide fut ouverte, je trouvai le ligament capsullaire qui embrasse toute la circonference de la [illegible] cavité de l'omoplate et celle de la tête de l'humerus, rompu a son origine au dessus du col de ce meme os, et ce qui en restoit ne formoit plus que deux bandes epaisses, assés semblables aux ligamens croisés qui se trouvent sous la rotulle.

l'extremité de l'acromion etoit fracturé, les pieces ne s'etoient point reunies mais leurs extremités reciproques etoient enduites d'une croute blanche molle polie et semblable au cartillage, et etoient maintenues rapprochées exterieurement par le perioste et des expensions ligamenteuses; cette piece, je veux dire l'extremité fracturée n'avoit qu'un trés petit mouvement et supportoit les efforts de la tête de l'humerus. le sujet d'ailleurs se servoit facilement de son bras, pendant sa derniere maladie.

ARC 33 d.3 n°35
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Observation sur une espece particuliere de hernie formée par le tissu cellulaire du peritoine.

Je trouvai sur le meme sujet, dans l'espace qui se trouve entre le cartillage xiphoïde et l'ombilic trois petites tumeurs molasses dont les deux plus considerables etoient grosses comme des noisettes, et la plus petite etoit de la grosseur d'un pois. Je disséquai la peau et je decouvris ~~ces tumeurs qui etoient~~ graisseuses, ~~et qui etoient~~ renfermées dans des kistes très minces; j'examinai leurs bases et je trouvai qu'elles prenoit naissance d'un pedicule d'environ trois lignes de circonference, qui sortoit d'une ouverture ronde pratiquée au millieu de la ligne blanche, et le pedicule tiroit son origine du tissu cellulaire du peritoine, qui probablement s'etoit fait jour au dehors par quelques unes des ouvertures qui donnent passage aux vaisseaux, car on appercevoit aucune dilaceration ni écartement entre les fibres aponevrotiques qui composent la ligne blanche.
Cette observation n'est pas fort interessante par elle meme, neammoins elle peut donner l'idée d'une nouvelle espece de hernie, qui peut donner lieu a une loupe a un sarcomphalle et meme a un carcinome qui auroit son origine dans l'interieur du ventre, ou pour parler plus juste, sous les muscles du bas ventre

Observation sur une hernie inguinalle avec un double sac herniaire ——

Le meme homme portoit aussi une hernie inguinalle du coté gauche qui desendoit jusqu'au millieu du cordon spermatique. —
je dissequai le cordon et apres avoir decouvert le muscle cremaster je le levai et je trouvai dessous un sac herniaire blanc un peu ridé et qui etoit adherent a ce muscle; je l'ouvris dans sa longueur et je trouvai dessous un second sac pareillement blanc et recouvert d'un peu de graisse. il adheroit au premier par un tissu cellulaire trés fin et fort lâche, je l'ouvris aussi et il etoit de la meme epaisseur que le premier; j'examinai quelle etoit l'origine de ces deux sacs et je remarquai que l'exterieur naissoit du tissu cellulaire du peritoine, et que l'interieur etoit formé par la vrai lame de cette membrane: je ne trouvai rien dans ces sacs parce que les parties etoient rentrées d'elles meme en placant le sujet sur la table.
Cette espece de hernie pourroit en imposer dans l'operation du bubonocele, en faisant prendre pour l'intestin ce qui ne seroit qu'un sac herniaire.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Procureur d'Alcromion n° 120.
Bertin - Disdier